

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-10-81867352

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 97 41 42

ABONNEMENT ANNUEL 70

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 18 - 1e 12/10/81

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Sèxe du pommier après récolte :

Les larves de ce papillon creusent des galeries dans les branches des pommiers provoquant l'affaiblissement et le dépérissement des arbres. Leur activité est grande dans les plantations de la plaine sub-littorale. La lutte doit être entreprise à l'aide d'une pulvérisation copieuse effectuée à la lance. Il faut avoir le souci de mouiller les charpentières et les troncs jusqu'au bourrelet de greffe.

Le traitement effectué à mi-octobre, par temps sec, à l'aide de *dichlorvos* (200 grammes matière active à l'hectolitre) ou d'*oléoparathion* (60 grammes matière active à l'hectolitre) est fondamental ; celui de printemps est seulement complémentaire.

Lutte contre les tavelures -

La destruction des formes hivernales peut être assurée :

- soit par traitement du feuillage, après récolte ou au tout début de la chute des feuilles à l'aide de 120 kilogrammes de perlurée à l'hectare, dissous dans mille litres d'eau.
- soit par traitement des feuilles du sol (même solution que ci-dessus), mais on peut également utiliser le *sulfate d'ammoniaque* à raison de 260 kilogrammes à l'hectare, quantité dissoute dans au moins mille deux cents litres d'eau.

Il convient d'éviter tout dépôt de produit dans les appareils, de mélanger d'autres substances, et d'empêcher toute corrosion des pièces par un rinçage soigné des appareils.

OLIVIER

Mouche de l'olive :

On devra assurer la protection des olives tardives (à récolter en octobre début novembre) en répétant le traitement déjà conseillé.

Fumagine - Cycloconium : l'adjonction de cuivre est préconisée.

Saissetia : Dans les olivettes attaquées par cette cochenille, effectuer un traitement à base de *méthidathion* ou d'*oléoparathion*. Ce ravageur engendre les implantations de fumagine.

P.1.4.06

CULTURES FLORALES (Chrysanthèmes)

Botrytis : Veiller à éviter tout développement important par l'application d'**iprodione** (**Rovral**) ou de **vinchlozoline** (**Ronilan**).

Rouille blanche : Rappelons que cette grave maladie est combattue par des applications d'**oxycarboxine** (**Plantvax**) ou de **triforine** (**Funginex**).

COLZA

Les difficultés d'installation des cultures sont évidentes cette année. Cependant dans les zones où les semis ont pu être effectués, la surveillance contre les limaces et les altises est recommandée.

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE,
Chef de la Circonscription "Languedoc-Roussillon",

V. LAGAUE

Tirage du 9 octobre 1981 - 1 100 exemplaires